




Informatie van uw tandarts

Verdoving





Behandeling met verdoving

Een tandartsbehandeling hoeft niet vervelend of pijnlijk te zijn.

Er zijn verschillende middelen om uw bezoek aan de tandarts op een ontspannen, comfortabele manier te laten verlopen. Voor sommige behandelingen is een plaatselijke verdoving noodzakelijk.

Wie mag er een verdoving geven?

De tandarts en mondhygiënist zijn de enigen die een zelfstandige bevoegdheid hebben om een verdoving toe te dienen. Hij/zij kan deze taak echter wel delegeren aan een tandarts- of preventieassistent. De tandarts dient wel in de praktijk aanwezig te zijn wanneer het toedienen van de verdoving is overgedragen.



Een verdoving is aan te raden bij cariës (gaatjes), een wortelkanaalbehandeling, behandeling aan wortelpuntontsteking, het aanleggen van een kroon en het trekken van tanden en kiezen.

Hoe werkt een verdooving?

Om een gedeelte in uw mond te verdoven, kan een eerste oppervlakkige verdooving worden toegepast. In dit geval wordt het slijmvlies verdoofd zodat u minder voelt van de prik. Een oppervlakkige verdooving wordt ook wel gebruikt om pijnlijke wondjes in de mond te verzachten.

Om een behandeling pijnloos te laten verlopen, krijgt u een lokale verdooving. De gebruikte vloeistof heeft een vaatvernauwende en zenuwblokkerende werking. Door de verdooving kunnen uw tong en lippen dik en tintelig aanvoelen. Dit verdwijnt als de verdooving is uitgewerkt. Meestal is dat na één tot enkele uren.

Verdoovingsmiddel

Uw behandelaar kiest het voor u meest geschikte verdoovingsmiddel en zal die keuze zondig toelichten. U kunt ook altijd om een toelichting vragen. Uw leeftijd, medische situatie en de voorgenomen behandeling kunnen van invloed zijn op de keuze.

De gebruikte materialen:

- zalf en spray: lidocaïne
- injectievloeistof:
standaard: articaïne 4%
- adrenaline 1:200.000 of
1:100.000

Bij ernstige hartaandoeningen
of allergie voor articaïne:
octapressine 3% zonder
adrenaline.



Is lokale verdoving veilig?

Elke medische en tandheelkundige ingreep heeft een gering risico. Dit geldt ook voor een lokale verdoving. De kans dat er bij het toepassen van lokale verdoving bijwerkingen optreden, is echter uiterst klein.

Wanneer er bijzonderheden optreden, dan neemt uw behandelaar passende maatregelen en worden de bijzonderheden vastgelegd in uw patiëntendossier.

Wat kunt u zelf doen?

Uw behandelaar zal wijzigingen in uw gezondheid en uw medicijngebruik periodiek met u bespreken. De daarbij gesignaleerde veranderingen worden in uw dossier opgenomen. Wij vragen u alle veranderingen aan ons door te geven. Daarbij hoort ook het melden van een zwangerschap. Een zwangerschap hoeft niet in alle gevallen een reden te zijn om af te zien van het geven van lokale verdoving.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

